

Dickdarmspiegelung (Koloskopie) mit allfälliger Polypenentfernung Informationsblatt und Einverständniserklärung

Name, Vorname, Geburtsdatum

Untersuchungsdatum, Zeit

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient

Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt sofort nach Erhalt genau durch, beantworten Sie den Fragebogen auf der zweiten Seite und bringen Sie die unterschriebene Einverständniserklärung zur Untersuchung mit.

Weshalb erfolgt eine Dickdarmspiegelung?

Bei der Dickdarmspiegelung werden der gesamte Dickdarm, die letzten Abschnitte des Dünndarmes sowie der Enddarm inklusive des Afters untersucht. Es lassen sich damit Erkrankungen dieser Organe feststellen und teilweise auch behandeln oder der Verlauf einer bereits bekannten Darmerkrankung kontrollieren.

Welche Vorbereitungen sind nötig?

Die Spiegelungsuntersuchung erfordert zuvor eine gründliche Reinigung des Darmes. Bitte befolgen Sie die separate Anleitung zur Darmreinigung genau.

Falls Sie Blutverdünnungsmittel (z.B. Brilique, Clopidogrel, Efigent, Eliquis, Lixiana, Marcoumar, Plavix, Pradaxa, Xarelto) benötigen, besprechen Sie bitte im voraus mit Ihrem Hausarzt oder mit uns, ob und wie Sie die entsprechenden Medikamente in den letzten 7-10 Tagen vor der Untersuchung einnehmen sollen. Auch bei Diabetes-Medikamenten können spezielle Anpassungen nötig sein. Aspirin cardio und andere Medikamente können bis zur Spiegelung unverändert weitergeführt werden.

Wie läuft die Untersuchung ab?

Durch den After wird ein dünner beweglicher „Schlauch“ (Endoskop) eingeführt, an dessen Spitze eine Lichtquelle und eine Kamera angebracht sind. Damit kann der Arzt die Schleimhaut des Darmes einsehen und nach krankhaften Veränderungen absuchen. Spezielles Zubehör erlaubt es, kleine Gewebeprobe (Biopsien) zur mikroskopischen Analyse zu entnehmen.

Es ist möglich, dass anlässlich der Spiegelung ein oder mehrere Polypen (gutartige Schleimhautgewächse) festgestellt werden. Da solche Polypen über Jahre in einen bösartigen Krebs übergehen können, werden sie falls möglich im selben Untersuchungsgang entfernt (Polypektomie).

Um die Darmwand gut einsehen zu können, wird der Darm während der Untersuchung etwas mit Luft aufgeblasen. Gelegentlich muss zum Weiterführen des Endoskopes von aussen auf den Bauch gedrückt oder eine Röntgendurchleuchtung durchgeführt werden. Während der Untersuchung ist neben dem Arzt auch eine speziell geschulte Endoskopieassistentin anwesend.

Ist die Untersuchung schmerzhaft?

Die Verabreichung von Medikamenten mit schmerzstillender und entspannender Wirkung (Sedation) erlaubt eine schmerzfreie Durchführung der Darmspiegelung. Zum Spritzen dieser Medikamente wird am Arm eine dünne Venenkanüle gelegt. Da die Atemtiefe wegen der Sedation etwas reduziert sein kann, erfolgt sicherheitshalber eine leichte Sauerstoffzufuhr durch eine feine Nasensonde unter dauernder Kontrolle der Sauerstoffsättigung mittels einer Messsonde am Finger.

Welche Risiken sind mit der Dickdarmspiegelung verbunden?

Die Spiegelung selbst, die Entnahme von Gewebeprobe und Polypenentfernungen sind risikoarm. Es kann aber trotz grösster Sorgfalt selten zu Komplikationen kommen, die in Ausnahmefällen auch lebensbedrohlich sein können. Mögliche Komplikationen sind Blutungen (0.5-3%), welche am häufigsten unmittelbar nach der Abtragung von grösseren Polypen auftreten, und die meist direkt bei der Spiegelung wieder gestoppt werden können. Seltener können verzögerte Blutungen innerhalb der ersten Woche nach Behandlung auftreten. Sehr selten sind Verletzungen der Darmwand bis hin zum Durchbruch (Perforation) (<0.5%), in dessen Folge manchmal eine Operation notwendig wird. Nach Verabreichung von Medikamenten zur Sedation kann es in seltenen Fällen zu Beeinträchtigungen der Atem- und Herzfunktion kommen.

(bitte wenden)

Gesundheitsfragen

Die vollständige Beantwortung dieser Fragen hilft mit, das Untersuchungs-Risiko möglichst gering zu halten.

- Benötigen Sie Blutverdünnungsmittel (z.B. Aspirin cardio, Brilique, Clopidogrel, Efient, Eliquis, Lixiana, Marcoumar, Plavix, Pradaxa, Tiatral, Xarelto) oder haben Sie in den letzten 7 Tagen entzündungshemmende Schmerzmittel genommen? Ja Nein

Wenn ja, welche

- Besteht eine vermehrte Neigung zu Blutungen? Ja Nein

- Besteht eine Allergie oder Überempfindlichkeit auf gewisse Medikamente? Ja Nein

Wenn ja, welche

- Besteht eine Allergie auf Eier oder Sojabohnen? Ja Nein

- Besteht eine Allergie auf Latex oder Heftpflaster? Ja Nein

- Leiden Sie an einem Herzklappenfehler oder wurden Sie am Herzen operiert? Haben Sie einen Ausweis zur Endokarditis Prophylaxe? Tragen Sie einen Herzschrittmacher oder Defibrillator? Ja Nein

Wenn ja, was

- Leiden Sie an Diabetes, Nierenerkrankung, Lungenkrankheit oder Epilepsie? Ja Nein

Wenn ja, was

- Bei Frauen: Besteht möglicherweise eine Schwangerschaft? Ja Nein

- Welche Medikamente haben Sie in den letzten 2 Wochen eingenommen?

.....

Was geschieht nach der Untersuchung?

Zunächst können Sie sich im Ruheraum noch etwas erholen, bevor die Besprechung der Resultate stattfindet. Nach Erhalt von Medikamenten zur Sedation dürfen Sie nach der Untersuchung für 12 Stunden keine Fahrzeuge lenken oder Maschinen bedienen und können auch keine rechtsgültigen Unterschriften leisten.

In den Stunden nach der Untersuchung kann durch die vermehrte Luft im Darm noch ein Druckgefühl im Bauch bestehen. Nimmt dieser Druck zu oder treten neue Bauchschmerzen auf, beobachten Sie eine Blutung aus dem After oder bekommen Sie Fieber, informieren Sie uns unverzüglich oder gelangen Sie an Ihren Hausarzt oder suchen Sie die Notfallstation des nächsten Spitals auf.

Weitere Fragen?

Falls noch Unklarheiten bezüglich der geplanten Untersuchung bestehen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Hausarzt oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Ich, die/der Unterzeichnende habe von diesem Informationsblatt Kenntnis genommen und bin mit der Durchführung einer Darmspiegelung inklusive Sedation und allfälliger Polypenentfernung einverstanden.

Ort, Datum	Unterschrift PatientIn	Unterschrift Arzt
.....